

Lähetetty: Koukkula Mimmi (THL) <Mimmi.Koukkula@thl.fi>

Lähetetty: maanantai 16. maaliskuuta 2020 11.15

Aihe: VS: KAA 1/2019 vp

Hei,

Kouluterveyskyselyn tulokset eivät ole vielä valmistuneet, jaan ne teille heti kun valmistuvat. Arvioisin että 2-3viikkoa vielä menee.

FinMonik-tutkimuksen raportti löytyy täältä: <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-034-1> sivu 131.

Taulukko 8.6.1 Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen maaryhmittäin, 18–64-vuotiaat, mallivastaus, %

	Naiset % (LV)
Venäjä ja entinen Neuvostoliitto	NA
Viro	NA
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka	8,0 (4,3–14,6)
Muu Afrikka	18,3 (9,7–31,8)
Aasia	0,6 (0,2–1,6)
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka	NA
Muut maat ¹	NA
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä	2,4 (1,5–3,7)

LV = 95 %:n luottamusväli

NA = Vähäisten vastaajamäärien vuoksi lukua ei esitetä.

¹Latinalainen Amerikka, entinen Jugoslavia ja muut maat

Kaikista naisista noin kaksi prosenttia kertoi läpikäyneensä sukuelinten silpomisen (taulukko 8.6.1). Yleisimmin silpomisesta kertoivat 30–44-vuotiaat naiset, joista silpomisen läpikäyneitä oli noin kolme prosenttia. Nuorimmassa ikäryhmässä, 18–29-vuotiaissa, silpomisesta raportoi vajaa kaksi prosenttia ja vanhimmassa ikäryhmässä, 45–64-vuotiaissa, kaksi prosenttia vastanneista. Tutkimukseen osallistuneet naiset kertoivat silpomisen tapahtuneen keskimäärin seitsemänvuotiaana. Naisten sukuelinten silpomisen kokeneita oli erityisesti Lähi-idästä ja Afrikasta muuttaneiden naisten joukossa, joista 8–18 prosenttia oli läpikäynyt sukuelinten silpomisen.

Silpomisen esiintyvyys (2 %) oli tässä tutkimuksessa alhaisempi kuin aiemmissa aihetta käsittelevissä Suomessa toteutetuissa ulkomaalaistaustaisten väestötutkimuksissa. Tutkimustuloksia ei voi kuitenkaan suoraan verrata toisiinsa, eikä näin ollen tehdä päätelmää ilmiön esiintyvyyden vähenemisestä, sillä tutkimusten tiedonkeruutavat poikkeavat toisistaan. Tutkittavien lähtömaat eivät myöskään olleet täysin samanlaisia eri tutkimuksissa, jolloin silpomisperinnettä harjoittavilta alueilta tulevien lukumäärät olivat erilaiset. Koko väestöä koskevissa tutkimuksissa ei ole toistaiseksi kysytty silpomisen esiintyvyydestä. Afrikan ja Lähi-idän maista tulleilla naisilla silpomista esiintyi tulosten perusteella eniten ja näin ollen silpominen voi vaikuttaa heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Myös muilta alueilta, kuten Aasiasta, tulleet naiset raportoivat läpikäyneensä silpomisen, joten silpomisen estämiseen ja silpomisen läpikäyneiden auttamiseen kohdistettuja toimia tulee tarjota myös muille kuin Afrikasta lähtöisin oleville tytöille ja naisille.

yt.Mimmi